

LINIKA

TOXINA BOTULINICA TIPO A

NSP
NEO SKIN PHARMA

IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV

www.linika.com.mx



50
UNITS
STERILE

100
UNITS
STERILE

200
UNITS
STERILE

LINIKA

TOXINA BOTULINICA TIPO A

IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

"MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA"



CADA VIAL DE 50U. CONTIENE

Dextran	15mg
Manitol	15mg
NaCl	0.45mg

50
UNITS
STERILE



CADA VIAL DE 100U. CONTIENE

Dextran	30mg
Manitol	30mg
NaCl	0.9mg

100
UNITS
STERILE



CADA VIAL DE 200U. CONTIENE

Dextran	60mg
Manitol	60mg
NaCl	1.8mg

200
UNITS
STERILE

PROPIEDADES

LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —

NSP
NEO SKIN PHARMA

IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV

www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”



INDICACIONES APROBADAS PARA SU USO

- Medicina Estética.
- Cirugía Plástica.
- Dermatología.
- Neurología.
- Pediatria.
- Oftalmología.



ALMACENAMIENTO

- Sin reconstituir (SIN DILUIR) a -5°C.
- Reconstituida (DILUIDA) de 2° a 8°C.



FABRICANTE

Pharma Research Bio



PRESENTACIÓN FARMACÉUTICA

-Polvo liofilizado



COMPARADOR DE POTENCIA

100 / 50 UNIDADES

- Dilución a 1 ml (efectividad 200 %)
- Dilución a 2 ml (efectividad 100 %)

200 UNIDADES

- Dilución a 2 ml (efectividad 200 %)
- Dilución a 3 ml (efectividad 100 %)

¿POR QUE ELEGIR ?

LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —

IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DURACIÓN

Hasta por mas de
5 meses

MAYOR POTENCIA

Bloqueo muscular
más eficaz

APARIENCIA NATURAL

Efecto tensor y bloqueo
natural

COSTO BENEFICIO

Mejor precio en
el mercado

MELEABILIDAD

Alta resistencia a cambios
de temperatura

PRESENTACIÓN

50U
100U
200U



La **Toxina Botulínica tipo A LINIKA** debe mantener una cadena de frío (no estricta, dependiendo de los factores climáticos y de transportación); conservándose en refrigeración de 2° a 8°C o preferentemente en congelador a -5°C.



OLINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —

IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

La **Toxina Botulínica tipo A** OLINIKA se reconstituye en solución fisiológica estéril al 0.9% NaCl (cloruro de sodio) para generar una solución inyectable; el procedimiento debe llevarse a cabo en condiciones de asepsia y antisepsia.

DILUCIÓN PARA VIAL DE 50U, 100U Y 200U RECOMENDABLE PARA USO ESTÉTICO

VOLUMEN DE DILUYENTE AÑADIDO (ml)

	U/ 0.1 ml	50 U	100 U	200 U
C	10.0 ml	0.5 ml	1.0 ml	2.0 ml
O	5.0 ml	1.0 ml	2.0 ml	4.0 ml
N	2.5 ml	2.0 ml	4.0 ml	8.0 ml
S	1.25 ml	4.0 ml	8.0 ml	12.0 ml
E				
N				
T				
R				
A				
C				
I				
O				
N				



El contenido y la pureza del liofilizado de la **Toxina Botulínica tipo A** OLINIKA es mayor a cualquier otra toxina botulínica Tipo A en el mercado; ofrece mayor pureza, maleabilidad, potencia y duración.

RECOMENDABLE PARA SU APLICACIÓN

NSP
NEO SKIN PHARMA

LINIKA

TOXINA BOTULINICA TIPO A

IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

"MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA"



Evaluación objetiva, física y psicológica del paciente



Se recomienda utilizar tecnicas adecuadas y reconocidas



Preparación adecuada del paciente, adormecer la zona con el uso del hielo y otras formas de anestesia tópica



Se deben utilizar agujas finas y que no lleguen a profundizar demasiado para evitar tocar el periostio u otros grupos musculares. Calibre 27-31 (0.30-0.40 mm) con un volumen de 0.05 a 0.1 ml.



Uso de escalas, documentación fotográfica y firma de consentimiento informando después de explicar en forma exhaustiva el procedimiento y responder a las expectativas del paciente .



NOTA

La dosis por utilizar en cada paciente debe ser determinada por el médico tratante, quien deberá hacer una evaluación integral para lograr el aspecto más natural posible. En general puede señalarse que los varones requieren dosis mayores que las mujeres debido a la mayor masa muscular por tratar.

200
UNITS
STERILE

100
UNITS
STERILE

50
UNITS
STERILE

LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 200 UNIDADES = 2.2 ML/CC

TERCIO SUPERIOR



- FRENTE
- LEVANTAMIENTO DE CEJAS
- ENTRECEJO
- PERIORBICULAR DE OJOS
- BUNNY LINES



COMBINACIÓN DE TECNICAS

Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en 2.2 ml / cc



LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 200 UNIDADES = 2.2 ML/CC


TERCIO SUPERIOR



FRENTE



Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en 2.2 ml / cc



LEVANTAMIENTO DE CEJAS



LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 200 UNIDADES = 2.2 ML/CC

TERCIO SUPERIOR




ENTRECEJO

200
UNITS
STERILE



Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en 2.2 ml / cc



PERIORBICULAR DE OJOS

200
UNITS
STERILE

LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 200 UNIDADES = 2.2 ML/CC

TERCIO SUPERIOR




BUNNY
LINES

200
UNITS
STERILE



Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en 2.2 ml / cc



COMBINACIÓN
DE TECNICAS

200
UNITS
STERILE

LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 200 UNIDADES = 2.2 ML/CC

TERCIO INFERIOR



- SONRISA GINGIVAL
- LIP FLIP
- BRUXISMO (Músculo masetero)
- JOWL
- MENTON
- CUELLO DE NEFERTITI



COMBINACIÓN DE TÉCNICAS

Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en 2.2 ml / cc



LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 200 UNIDADES = 2.2 ML/CC

TERCIO INFERIOR



BRUXISMO



Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en 2.2 ml / cc



MENTON



LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 200 UNIDADES = 2.2 ML/CC


TERCIO INFERIOR



LIP FLIP



Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en 2.2 ml / cc



SONRISA GINGIVAL



LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx


“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 200 UNIDADES = 2.2 ML/CC

TERCIO INFERIOR



CUELLO DE NEFERTITI



JOWL



Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en 2.2 ml / cc



LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —

IMPORTADO


NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 100 UNIDADES = 1.1 ML/CC

DILUCION 50 UNIDADES = 0.5 ML/CC

TERCIO SUPERIOR



● MÚSCULOS FRONTALES

● MÚSCULO CORRUGADOR

● MÚSCULO PROCERUS

● MÚSCULO PERIORBICULAR

● MÚSCULO INFRAORBITARIO



COMBINACIÓN DE TÉCNICAS

2

Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en 1.1ml / cc = 100U de (DILUCION) ; O en 0.5ml / cc = 50u de (DILUCION)



LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —

IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 100 UNIDADES = 1.1 ML/CC
DILUCION 50 UNIDADES = 0.5 ML/CC

TERCIO SUPERIOR



MÚSCULOS FRONTALES



MÚSCULO CORRUGADOR



Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en
1.1ml / cc = 100U de (DILUCION) ; O en 0.5ml / cc = 50u de
(DILUCION)

OLINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx


“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 100 UNIDADES = 1.1 ML/CC
DILUCION 50 UNIDADES = 0.5 ML/CC

TERCIO SUPERIOR



MÚSCULO PROCERUS



MÚSCULO PERIORBICULAR



Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en
1.1ml / cc = 100U de (DILUCION) ; O en 0.5ml / cc = 50u de
(DILUCION)



LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx


“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 100 UNIDADES = 1.1 ML/CC
DILUCION 50 UNIDADES = 0.5 ML/CC

TERCIO SUPERIOR



MÚSCULO
INFRAORBITARIO



COMBINACIÓN DE
TÉCNICAS



Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en
1.1ml / cc = 100U de (DILUCION) ; O en 0.5ml / cc = 50u de
(DILUCION)



LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —

IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”


DILUCIÓN 100 UNIDADES = 1.1 ML/CC
DILUCION 50 UNIDADES = 0.5 ML/CC

TERCIO INFERIOR

● MÚSCULO ORBICULAR DE LABIO.

● MÚSCULO MENTONIANO

● PLATISMA



Músculo orbicular de labios 1 1 1 1
Músculo mentoniano 2 2
Platisma 2 2 2 2

COMBINACIÓN DE TÉCNICAS

2

Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en 1.1ml / cc = 100U de (DILUCION) ; O en 0.5ml / cc = 50u de (DILUCION)



LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 100 UNIDADES = 1.1 ML/CC
DILUCION 50 UNIDADES = 0.5 ML/CC

TERCIO INFERIOR



MÚSCULO
MENTONIANO



PLATISMA



Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en
1.1ml / cc = 100U de (DILUCION) ; O en 0.5ml / cc = 50u de
(DILUCION)

LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx


“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

DILUCIÓN 100 UNIDADES = 1.1 ML/CC
DILUCION 50 UNIDADES = 0.5 ML/CC

TERCIO INFERIOR



MÚSCULO ORBICULAR DE LABIOS



COMBINACIÓN DE TÉCNICAS



Cada punto representa la cantidad de unidades diluidas en
1.1ml / cc = 100U de (DILUCION) ; O en 0.5ml / cc = 50u de
(DILUCION)

LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —


IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

RECOMENDACIONES POSTERIORES A LA APLICACIÓN DE TOXINA BOTULÍNICA TIPO A.


No asolearse o exponerse a altas temperaturas (ej. sauna y baños de vapor) ya que el efecto de la Toxina Botulínica tipo A LINIKA puede disminuir.



Es recomendable señalar que las terapias que incrementan la temperatura y movilidad local en cada paciente, como láser, luz pulsada, radiofrecuencia y tratamientos similares deben suspenderse, hasta que el médico indique su aplicación.



No maquillarse después de la aplicación.



Evitar el consumo de alimentos alergénicos; así como anticoagulantes y suplementos vitamínicos.




LINIKA

IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”



**COMPARATIVO
TOXINAS BOTULINICAS TIPO A**



**CONTRADICCIONES
ABSOLUTAS**



Tratamiento con antibióticos de tipo espectinomicinaaminoglucósidos.



Enfermedades Neuromusculares como la miastenia gravis.



Esclerosis múltiple o lateral amiotrófica(ELA)



Síndrome de Lambert-Eaton.



Tratamientos con fármacos que puedan potenciar el efecto de la Toxina Botulínica tipo A como aminoglucósidos, sulfato de magnesio o quinina.




Embarazo y lactancia.

LINIKA


— TOXINA BOTULINICA TIPO A —

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”



CONTRAINDICACIONES GENERALES

Aunque la aplicación de Toxina Botulínica tipo A LINIKA es un procedimiento bien tolerado, se recomienda leer las siguientes contraindicaciones:



CONTRAINDICACIONES RELATIVAS

01



Coagulopatías
congénitas o adquiridas.

02



Síndrome dismórfico.

03



Pacientes con expectativa
poco realistas.

LINIKA

— TOXINA BOTULINICA TIPO A —

IMPORTADO

NEO SKIN PHARMA SA DE CV
www.linika.com.mx

“MAS PACIENTES CON FORMULA MEJORADA”

En el campo de la medicina estética, las reacciones adversas normalmente suelen ser consecuencia de la técnica de aplicación, pudiendo ser las siguientes:



Mareos.



Inflamación en el sitio de inyección.



Ptosis palpebral: Caída del párpado.



Dolor localizado: Este puede disminuir utilizando agujas finas.



Equimosis, hematoma, edema o inflamación en las zonas de aplicación.



Las complicaciones y efectos secundarios mencionados con anterioridad son transitorios y no requieren tratamiento.



Cefalea: Dolor de cabeza leve a moderado. Se resuelve en los primeros 10 días posteriores a la aplicación.



Se recomienda un seguimiento a las 2 o 4 semanas después del tratamiento inicial con Toxina Botulínica tipo A para lograr óptimos resultados.